

Çizelge 1. Yalancı kelebek (*Ricania japonica*)'in mücadelesinde 2025 yılı tavsiye edilen geçici Bitki Koruma Ürünleri

Bitki ve Etmen Adı	Önerilen Aktif Madde Adı ve Oranı	Formülasyon Şekli	Uygulama Dozu (100 L su veya dekar)	Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süre (PHI) (gün)	Mrl Değeri (mg/kg)	Uygulama zamanı, şekli ve sayısı	Geçici Tavsiye İçin Önerilen Tarih Aralığı (Başlangıç tarihi – Bitiş tarihi)
Fasulye, Hıyar, Mısır Yalancı kelebek (<i>Ricania japonica</i>)	10 g/L Azadirachtin	EC	400 ml/100 L	3 gün	Fasulye (kavuzlu):1 Fasulye (kavuzsuz):1 (fasulye-kuru tohum hariç*) Hıyar:1 Mısır :1	(2., 3. ve 4. nimf dönemleri) Nimf yoğunluğu başladığında, yaprak altına iyi kaplama sağlayacak şekilde pülverizatör ile; 1–2 uygulama	15.08.2025-30.09.2025
Narenciye, Fasulye, Hıyar, Mısır	% 80 Kükürt	WG	250 gr/100 L	7 gün	-		
Yalancı kelebek (<i>Ricania japonica</i>)	% 240 Spinosad	SC	35 ml/100L	3 gün	Mısır: 2 Narenciye: 0.3 Fasulye:0.3 (fasulye-kuru tohum hariç*) Hıyar:0.3 Greyfurt:0.3 Portakal:0.3		

					Limon:0.3 Mandarin:0.3		
	60 g/l Orange oil	ME	200 ml/100 L su	-	-		

***Fasulye (kuru tohum) 0.01* mg/kg. Kalıntı yönüyle sorun olabileceğinden kuru tohum üretiminde kullanılması önerilmez.**

MÜCADELE YÖNTEMLERİ:

- Zararlı kışı yumurta döneminde geçirdiğinden bahçelerin kenarındaki yabancı otlar (çit bitkileri, çalı formundaki bitkiler, böğürtlen, çok yıllık otsu bitkiler, mürver vb.) ve konukçusu olan fasulye, mısır, hıyar ve patlıcan vb. bitki artıkları hasat sonunda toplanmalı ve imha edilmelidir. Ağaç ve asmaların yumurta bırakılmış sürgün ve dalları budanmalı ve imha edilmelidir.
- Zararlının mücadelesinde kitle halinde tuzakla yakalama yönteminden elektrikle çalışan ışık ve ışık+su kombine tuzakları kullanılır. Erginlere karşı altında toplama kabı bulunan ışık tuzağı 1 adet / dekar olacak şekilde yerden 1.00-1.30 m yüksekliğe asılır. Işık tuzakları; zararlının erginlerinin görülmesi ile yerleştirilir son ergin görülene kadar izlenir.
- Sarı renkli su tuzakları zararlının nimflerinin görülmesi ile birlikte yerleştirilir, son ergin görülene kadar izlenir. Ev bahçelerindeki sebze alanlarına 40 X 100 cm boyutunda, 35 cm derinliğinde yarısına kadar su dolu sarı renkli su tuzaklarının içerisine 3-5 damla zeytinyağı damlatılarak 10 adet/dekar olacak şekilde yerleştirilir. Suyu kirlendiğinde değiştirilir veya azaldığında ilave edilir.
- Nimfler çıktıktan sonra konukçularında yapılan örneklemede 10 cm'lik sürgünde ortalama 10 ve daha fazla nimf (2., 3. ve 4. nimf dönemleri) tespit edildiğinde tavsiye edilen Bitki Koruma Ürünü ile mücadele yapılabilir.